

Checklist te gebruiken bij de counseling voor Trial Of Labour After Caesarean section (TOLAC) versus Elective Repeat Caesarean Section (ERCS)

Overloop de contra-indicaties voor TOLAC			<input type="checkbox"/>
Uterus ruptuur in anamnese (recidief > 5%)			
Mediane of T-incisie bij vorige sectio: op te zoeken in vorige sectio verslag			
Andere contra-indicaties voor vaginale baring bvb. placenta praevia, liggingsafwijkingen			
Kans op		Algemeen	
Geslaagde Vaginal Birth After Caesarean (VBAC) bij voorgeschiedenis van 1 keizersnede, geen vaginale bevalling		65-70%	<input type="checkbox"/>
Geslaagde VBAC bij voorgeschiedenis van 1 keizersnede en minstens 1 vaginale bevalling		85-91%	<input type="checkbox"/>
Geslaagde VBAC bij voorgeschiedenis van 1 keizersnede wegens liggingsafwijking		84%	<input type="checkbox"/>
Risico op	TOLAC	ERCS	
Uterus ruptuur	0,35 à 0,50% Spontane arbeid (0,15-0,4%) Inductie (0,54-1,4%) Augmentatie (0,9%-1,9%)	<0,03%	<input type="checkbox"/>
Maternale morbiditeit en mortaliteit			
Algemeen	Kunstverlossing (tot 39%) Sfincterletsel (5%), urine-incontinentie (korte termijn) (meer kans bij macrosomie en/of kunstverlossing)	Langer ziekenhuisverblijf en herstel Mogelijkheid tot sterilisatie	<input type="checkbox"/>

	Meer kans op geslaagde borstvoeding			
Bloedtransfusie	2%	1%		<input type="checkbox"/>
Mortaliteit	0,004% bij geslaagde VBAC	0,013%		<input type="checkbox"/>
Risico bij volgende zwangerschap	Niet van toepassing bij geslaagde VBAC	Placenta praevia, abnormale placentatie, chirurgische complicaties bij herhaalde sectio		<input type="checkbox"/>
Neonatale morbiditeit en mortaliteit				
Transient tachypnoe of the newborn (TTN)	3%	4-6%		<input type="checkbox"/>
Hypoxisch ischemische encephalopathie	0,08%	0,01%		<input type="checkbox"/>
Mortaliteit	0,04% = vaginale partus nullipara	<0,01%		<input type="checkbox"/>
Bijkomend besproken				
Intrapartum beleid: continu cardiotocografie (CTG), intraveneuze toegangsweg.				<input type="checkbox"/>
Geen contra-indicatie voor epidurale verdooving				<input type="checkbox"/>
Kans op urgente of semi-urgente keizersnede omwille van bedreigd welzijn van het kind of niet vorderen van de bevalling.				<input type="checkbox"/>
Planning				
Preterme arbeid (< 37 weken)	<input type="checkbox"/> TOLAC	<input type="checkbox"/> ERCS		
Spontane arbeid vóór geplande ERCS	<input type="checkbox"/> TOLAC (Opmerkingen hieronder)	<input type="checkbox"/> ERCS		
Serotiniteit (>41 weken)	<input type="checkbox"/> TOLAC	<input type="checkbox"/> ERCS		

	(Opmerkingen hieronder)	
Afspraken omtrent inductie		
Afspraken omtrent augmentatie (amniotomie - oxytocine)		
Planning ERCS		
Aanvullende opmerkingen		

Checklist counseling: gebaseerd op RCOG en Queensland guidelines [5,8]